



Silná imunitní odpověď po aplikaci vakcíny Porcilis® PCV ID

Intramuskulární i intradermální vakcinace vyvolala spolehlivou a detekovatelnou humorální a buněčnou imunitní odpověď založenou na přítomnosti IgG a IFN- γ , což signalizuje spolehlivou imunitní odpověď v případě obou způsobů aplikací.³



329 SELAT PO ODSTAVU
Historie výskytu PCV2.



28 dnů



Skupina ID



Skupina IM



Skupina C

HUMORÁLNÍ A BUNĚČNÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ 21 DNŮ PO VAKCINACI

	ID	IM	C
IgG (průměr $\pm$ SD log ₂)	2,9 $\pm$ 0,4 ^b	3,3 $\pm$ 0,17 ^a	neg
% IgG sérokonverze	96% (23/24)	100% (25/25)	0% (0/26)
IFN- γ (SC/10 ⁶ PBMC)	17,9 ^a	26,4 ^a	2,0 ^b

Sérologický test – Ingezim Circo IgG, Ingenasa.

^{a, b} Hodnoty s různými indexy v témže sloupci jsou významně odlišné ($p < 0,001$).

VAKCINAČNÍ PROTOKOL

ID: Intradermální podání vakcíny Porcilis® PCV ID bezjehelným aplikátorem IDAL®.

IM: Intramuskulární podání vakcíny Porcilis® PCV.

C: Kontrolní skupina, bez vakcinace.

